

Số: 152/TB-TTBVTV

Nam Định, ngày 23 tháng 7 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Phun trừ rầy lúa 4 phòng ngừa bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2019

#### I. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI CHÍNH

##### 1. Bệnh lùn sọc đen

Kết quả giám định virus từ ngày 01 - 23/7 có 02/82 mẫu rầy dương tính với virus lùn sọc đen, chiếm 2,4% (tại Giao Thủy, Nam Trực), thấp hơn so với cùng kỳ vụ trước; Tuy nhiên bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện trên 1,2 ha lúa tại tỉnh Lai Châu, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-7%, cao 10-15%, cục bộ 25% số cây; Ở một số tỉnh giáp ranh, qua xét nghiệm tỷ lệ dương tính với virus lùn sọc đen > 30%.

##### 2. Rầy nâu - RLT

Hiện nay, rầy lúa 4 (chủ yếu rầy lưng trắng) đã bắt đầu nở trên trà lúa mùa sớm (Hiển Khánh - Vụ Bản; Nghĩa Tân, Nghĩa Phú - Nghĩa Hưng; Nam Thanh, Nam Toàn - Nam Trực; ...), mật độ phổ biến 10-20 con/m<sup>2</sup>, cao 50-100 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 200-300 con/m<sup>2</sup>, phổ biến rầy trưởng thành và tuổi 1, 2; mật độ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, 2018. Trưởng thành tiếp tục đẻ trứng và tăng mật độ rầy. Trên địa bàn tỉnh rầy lúa 4 sẽ nở rộ từ ngày 27/7-02/8 trùng với giai đoạn rất mẫn cảm với bệnh lùn sọc đen hại lúa.

##### 3. Sâu keo mùa thu

Sâu phát sinh và gây hại trên ngô với mật độ trung bình 1-2 con/m<sup>2</sup>, cao 5-7 con/m<sup>2</sup> (Liên Bảo - Vụ Bản; Phương Định, Thị trấn Ninh Cường, Trúc Hùng - Trúc Ninh; Mỹ Tân - Mỹ Lộc; Nam Hồng - Nam Trực...). Toàn tỉnh có 5 ha nhiễm sâu keo mùa thu (Liên Bảo - Vụ Bản), đã phun trừ cho 2,5 ha ngô. Sâu tiếp tục gia tăng mật độ và gây hại mạnh trong thời gian tới.

#### II. CHỦ TRƯỞNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI

Để đảm bảo giành kết quả cao trong sản xuất vụ Mùa 2019, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, Ban nông nghiệp các xã/thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện tốt một số việc sau:

##### 1. Hướng dẫn chăm sóc, phát hiện kịp thời sâu bệnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa màu theo Công văn số 614/SNN-TTBVTV ngày 17/7/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2019.

- Tăng cường, điều tra, phát hiện và phun trừ kịp thời sâu keo mùa thu trên ngô, nhất là những diện tích ngô mới trồng.

##### 2. Tập trung phòng trừ một số đối tượng sau:

- Đối với rầy nâu - RLT lúa 4



+ Tổ chức phun thuốc trừ rầy lúa 4 để phòng ngừa bệnh lùn sọc đen tập trung từ ngày 27/7 - 02/8 chủ yếu trên những diện tích bị bệnh lùn sọc đen ở các năm trước và những vùng xét nghiệm có dương tính với virus lùn sọc đen.

+ Sử dụng thuốc có hoạt chất Thiamethoxam (*Amira 25WP, Onera 300WG, Impalaser 25WG...*), hoạt chất Imidacloprid (*Midan 10WP, Sectox 100WP, Aicmidac 100WP, Mikhada 20WP...*), hoạt chất khác (*Dupont™ Pexena™ 106SC, Chess 50WG, TVpymeda 350WP, ...*). Sau 3 ngày phun thuốc nếu rầy còn mật độ cao cần tiếp tục phun trừ lại.

**- Đối với sâu keo mùa thu trên ngô**

+ Rà soát, khoanh vùng, phun trừ sâu keo mùa thu cho những diện tích ngô có mật độ sâu  $\geq 4$  con/m<sup>2</sup>, đa số sâu tuổi 1 - 3.

+ Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (*Clever 150SC, Ammate® 150EC, Obaone 95WG, Sunset 300WG ...*); hoạt chất khác (*Prevathon® 5SC, Chlorferan 240 SC, Takumi 20WG, Match 050EC, ...*).

**- Đối với chuột:** Tích cực phát động và tổ chức diệt chuột, chú trọng biện pháp thủ công như đào bắt kết hợp với các loại bẫy. Tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

**3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV** ở các huyện, thành phố; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng và hướng dẫn nông dân sử dụng những loại thuốc theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật.

**Nơi nhận:**

- Cục BVTV; TT BVTV phía Bắc;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở NN - PTNT;
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN-PTNT, Trung tâm DVNN các huyện, TP;
- Đài PT-TH, Báo Nam Định;
- Website Sở NN & PTNT, Chi cục TTBVTV;
- Lưu: VT, P. BVTV. *cb*

} (Để báo cáo)

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Trần Ngọc Chính**